

ТРУДЫ ОКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Выпуск II

МОСКВА — 1958

Я. В. САПЕТИН, В. М. ГАЛУШИН

КРУПНАЯ КОЛОНИЯ СЕРОЙ ЦАПЛИ

Летом 1956 г. в Шиловском районе Рязанской области, на правом берегу р. Оки, в 2 км к югу от с. Терехово, нами была обнаружена крупная колония серой цапли.

Колония расположена на участке сохранившегося от вырубки высокоствольного дубового леса общей площадью около 10 га. Гнезда построены на деревьях, растущих на пяти гривах шириной 10—15 м, расположенных среди ольхового болота. Преобладающей породой древостоя на этих гривах был дуб высотой около 30 м. В небольшом количестве здесь же росли ольха, вяз и липа высотой 15—20 м.

Всего в колонии нами было насчитано 266 гнезд серой цапли. Ими было занято 63 дуба (233 гнезда), 7 вязов (22 гнезда) и 6 ольх (11 гнезд), всего 65% имеющихся высокоствольных деревьев. Гнезда чаще всего были построены не ниже 15 м от поверхности земли, на концах ветвей диаметром 4—12 см. На одном дереве встречалось до 16 гнезд. Жилые гнезда составляли около 90% всех обнаруженных, таким образом всего в колонии гнездилось 240—250 пар серых цапель.

Из других птиц в колонии гнездились пара соколов балобанов, пара черных коршунов и 10—15 пар полевых воробьев. Интересно отметить, что балобан гнезвился на дубе, на котором находилось 6 жилых гнезд цапель. Полевые воробьи устраивали свои гнезда в стенках гнезд серых цапель.

Мы посетили эту колонию трижды. 9 июня в большинстве гнезд были пуховые птенцы, а в остальных либо яйца, либо уже оперенные птенцы. Число птенцов в гнездах колебалось от двух до шести. 3 июля почти во всех гнездах были вполне оперенные птенцы, причем около 20% из них уже летало. Пуховые птенцы были встречены лишь в 6 гнездах на наиболее низких и доступных деревьях, которые цапли занимали по-видимому в последнюю очередь. К 3 августа все птенцы поднялись на крыло и большинство их вместе с родителями покинуло колонию.

Судя по остаткам корма, основную пищу птенцов цапель в гнездовой период составляли щурята длиной 10—18 см. Лишь

изредка в гнездах встречались мелкие окуни и плотва размером 5—10 см. Очевидно, цапли добывали корм преимущественно на пересыхающих лужах, остающихся после разлива.

Во время посещения колонии нами были окольцованы 82 цапли (и 1 сокол балобан). До декабря 1956 г. уже были получены обратно 8 колец: 5 цапель были убиты в различных районах Рязанской области, 1 — в Пензенской, 1 — в Московской и 1 — в Арзамасской областях.

Из 82 окольцованных цапель 19 нами были пойманы на земле. Две из них были в дальнейшем убиты в соседних районах Рязанской области. Это говорит о том, что взрослые цапли продолжают кормить выпавших из гнезда птенцов на земле, причем последние погибают не чаще своих собратьев, остающихся в гнездах.

По рассказам местных жителей в 1938—1940 гг. цапли в этом месте гнездились одиночно или группами до пяти гнезд. В 1947—1950 гг. наблюдалось резкое увеличение количества гнезд.

Судя по последним литературным данным («Птицы Советского Союза», т. II, 1952), описанная колония цапель является одной из самых крупных в средней полосе Европейской части СССР.

В связи с тем, что данная колония является своеобразным памятником природы и может служить базой для изучения и кольцевания гнездящихся здесь птиц, на участке, где она расположена, по ходатайству Окского заповедника, запрещена рубка леса и учреждена охрана.
