


О ХАРАКТЕРЕ ПОЛИМОРФИЗМА ОКРАСКИ У ЕВРОПЕЙСКОГО ОСОЕДА

В. М. Галушин и Л. С. Степанян

ON THE POLYMORPHISM COLOURATION FEATURES IN THE EUROPEAN HONEY BUZZARD

V. M. Galushin and L. S. Stepanjan

Как известно, европейский осоед (*Pernis apivorus* L.) обладает полиморфной окраской. Однако географической локализации различных цветовых вариаций не наблюдается в такой степени, чтобы это можно было расценивать с точки зрения географического изоморфизма. В популяциях, во всяком случае населяющих северные и средние части ареала, встречаются особи с различными типами окраски, также различающиеся и по размерам (Дементьев, 1951)¹. В этой связи представляется весьма интересным



Птенцы осоеда в гнезде. 4. VIII 1957 г., Окский заповедник

нахождение в одном гнезде птенцов с различными типами окраски. Такой факт упоминается Г. П. Дементьевым (1951) для Московской области, где один из двух найденных в гнезде птенцов имел темный, другой — пестрый тип окраски. Ниже приводится еще один случай обнаружения птенцов осоеда разной окраски в одном гнезде. Гнездо было найдено в Окском заповеднике (Рязанская обл.) 7 августа 1957 г. Два находившихся в нем птенца имели крайние противоположные типы окраски. Даем краткое их описание (рис.).

1. Самец. Светлый тип. Брюшная сторона грязно-белая с очень узкими темными наствольями, несколько расширяющимися к концу пера. Горло, зоб, шея, голова, подхвостье — глинисто-беловатые. Лоб и темя темно-бурые, разделенные светлой полоской. Концы второстепенных и внутренних первостепенных маховых чисто белые. Величина этих белых пятен увеличивается по направлению снаружи во внутрь. Концы рулевых грязно-белые. Верх тела, маховые, рулевые, уздечка и кроющие уха темно-бурые. Размеры: длина — 430 мм, крыло — 265 мм, вес — 730 г.

¹ «Птицы Советского Союза», т. I. Изд-во АН СССР, 1951.

2. Самка. Темный тип. Брюшная сторона однообразно буро-коричневая. Подхвостье несколько светлей. Темные настволья очень узкие. Верх тела темно-бурый. Верх головы коричневый со светло-бурыми концами перьев. Концы второстепенных и внутренних первостепенных маховых и рулевых имеют узкие светлые окаймления. Размеры: длина — 455 мм, крыло — 275 мм, хвост — 160 мм, вес — 800 г. Необходимо указать, что оба родителя, насколько их удалось рассмотреть, снизу были окрашены в бурый цвет и лишь слабо различались интенсивностью этой окраски. Остается неясным вопрос — меняется ли окраска птиц при смене гнездового наряда на окончательный. Однако имеются все основания предполагать, поскольку полиморфизм существует и у взрослых птиц, что эти изменения не носят кардинального характера (т. е. не приводят к смене типа окраски) и определенный тип окраски данной молодой особи сохраняется у нее и во взрослом состоянии.

Таким образом, приведенные факты обнаружения в одном гнезде птенцов с различными типами окраски, родители которых имели однообразную окраску (в одном случае), заставляют сделать некоторый предварительный вывод о том, что полиморфизм, существующий внутри популяций европейского осоеда, носит, по всей видимости, индивидуальный характер. Не исключена возможность некоторой географической локализации определенных типов окраски, как на это указывает Г. П. Дементьев (1951).